



ВАКЦИНА JOHNSON & JOHNSON ОТ COVID-19

Узнайте Главные факты

Что нового?


По состоянию на апрель 2021 года образование тромбов в течение нескольких недель после получения вакцины J&J отмечено у 15 женщин в возрасте от 18 до 48 лет.

Тромбы образуются КРАЙНЕ РЕДКО

По состоянию на апрель 2021 года в США вакцину J&J от COVID-19 поставило более 8 миллионов человек.

У женщин в возрасте от 18 до 48 лет образование тромбов отмечено примерно у **7 из 1 миллиона женщин**. В категории от 49 лет и старше, а также у мужчин всех возрастов это еще более редкое явление.

Это означает, что вероятность того, что у человека после вакцинации может образоваться тромб, чрезвычайно мала.



Вероятность заболеть или летального исхода от COVID-19, гораздо выше, чем вероятность образования тромбов.

Безопасную вакцинацию вакциной J&J прошли миллионы людей, включая представителей разных рас, национальностей и возрастов.

1

Вакцина J&J - это всего **одна прививка**. Она удобна, безопасна и эффективна.

Доступны и другие варианты вакцин. Согласно статистике, образование тромбов отмечается только в связи с вакцинами, состоящими из двух доз.

За дополнительной информацией обратитесь к лечащему врачу о том, какая вакцина подойдет вам лучше.



СИМПТОМЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОТСЛЕЖИВАТЬ



Хотя вероятность образования тромбов очень мала, отслеживайте свое состояние в течение **3 недель** после введения вакцины J&J и немедленно обратитесь к врачу, если у вас появились какие-либо из следующих симптомов:

- Сильные или постоянные головные боли
- Нечеткое зрение
- Одышка
- Боль в груди
- Отек ног
- Постоянная боль в животе
- Небольшие синяки или крошечные кровавистые пятна под кожей в месте инъекции.

ВАКЦИНА J&J БЕЗОПАСНА

Представители здравоохранения США тщательно отслеживают проблемы со здоровьем, возникающие в связи с вакцинацией. Любая проблема рассматривается со всей серьезностью.

Органы здравоохранения приостановили использование вакцины J&J, чтобы собрать больше информации о тромбах.

Сам факт приостановки вакцины в связи со столь редким побочным эффектом свидетельствует о том, что работники здравоохранения очень тщательно отслеживают ход вакцинации.

В настоящее время установлено



Риск образования тромбов в результате применения вакцины J&J **крайне мал**



Тромбы поддаются **лечению**



Польза от вакцины значительно перевешивает риск ее использования

Защитите себя. Защитите своих друзей, знакомых и соседей. **Сделайте прививку.**