

"Recommended Vaccines for Children from 7 to 18 Years" was created and translated October 20,2023 by the Multilingual Health Education Alliance (M-HEAL). [DARI]

واکسین های توصیه شده برای اطفال ۷ تا ۱۸ ساله

نام طفل:

تاریخ تولد:



این سند بر بنیاد توصیه‌های ۱۰ فبروری سال ۲۰۲۳ مراکز کنترل و پیشگیری از مریضی های ایالات متحده میباشد.

اگر طفل شما به خارج از ایالات متحده (U.S.) سفر میکند، در منطقه ای زندگی میکند که عفونت دینگو (dengue) در آن شایع است، یا دارای یک وضعیت صحتی است که میتواند سیستم ایمنی بدن را تضعیف کند، از داکتر خود پرسان کنید که آیا واکسین یا دوز اضافی برای اطمینان از محافظت ضرورت است یا خیر.

اگر طفل شما هنوز تمام واکسین های دوران طفولیت خود را دریافت نکرده است، به "واکسین های توصیه شده برای اطفال تولد شده تا ۶ ساله" مراجعه کنید. داکتر شما برنامه دیگری برای اطمینان از اینکه آنها درگیر تمام واکسین های خود هستند، انجام خواهد داد.

۷ ساله	۸ ساله	۹ ساله	۱۰ ساله	۱۱ ساله	۱۲ ساله	۱۳ ساله	۱۴ ساله	۱۵ ساله	۱۶ ساله	۱۷ ساله	۱۸ ساله	
کووید ۱۹*												کووید ۱۹*
انفولانزا (۱ یا ۲ دوز در سال)												انفولانزا (زکام)
انفولانزا (۱ دوز در سال)												
Tdap												تیتانوس، دیفتری و سیاه سرفه
HPV (۲ یا ۳ دوز)**												ویروس پاپیلومای انسانی (HPV)**
MenACWY												مریضی مننگوکوک (MenACWY)
MenB***												مریضی مننگوکوک (MenB)***
کووید ۱۹* تعداد دوزها بستگی به سن و نوع واکسین مصرف شونده دارد												معلومات اضافی:
MenB برای همه اطفال در معرض خطر توصیه میشود. در صورت تمایل سایر اطفال ممکن است واکسین را دریافت کنند.												MenB: برای اطفال ۹ تا ۱۲ ساله، ۲ دوز HPV وجود دارد. برای اطفال که اولین دوز را در سن ۱۶ سالگی یا بالاتر دریافت میکنند، ۳ دوز HPV وجود دارد.